



PRÓTESE TOTAL IMEDIATA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Fábio Henrique Abruzeze Júnior¹; Tais Alves Da Silva¹; Vanessa Machado Buscariolo¹; Olavo Alcalde Panigali¹; Máisa Carnietto¹; Giulia Polidoro Alquati¹; Joel Ferreira Santiago Junior¹.

¹Área de Ciências da Saúde – Centro Universitário Sagrado Coração

fabioabruzezejr@gmail.com; taisalves27@outlook.com; vmbuscariolo@gmail.com; olavop88@gmail.com; macarnietto98@gmail.com; giuliaalq@gmail.com ; jf.santiagojunior@gmail.com;

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica com Bolsa - PIBIC

Agência de fomento: FAP/UNISAGRADO

Área do conhecimento: Saúde – Odontologia

Este projeto teve como finalidade conduzir uma revisão sistemática com metanálise (modelo Cochrane; PRISMA e PROSPERO: CRD42021246071) a fim de estudar os dados clínicos de diferentes estudos que avaliaram o desempenho de próteses totais imediatas em pacientes submetidos a este tipo de reabilitação oral. As bases de dados PubMed/Medline, Cochrane Collaboration, Web of Science e SciELO foram consultadas utilizando unitermos relacionados: `` Immediate Complete Denture ``; `` immediate denture ``; `` immediate total mouth Rehabilitation``. Os dados coletados foram tabulados e organizados qualitativamente e quantitativamente utilizando o software: Comprehensive Meta-Analysis. O nível de significância considerado foi de $p < 0.05$. Um total de 14 estudos clínicos foram incluídos nesta revisão sistemática, uma taxa de satisfação dos pacientes em relação ao tratamento proposto foi de 82,6% (95IC% 67,4-91,5), o qual foi considerada equiparável com outros tipos de próteses realizadas (overdentures e prótese total convencional). Em relação a necessidade de reembasamento das PTIs, um tempo médio de reembasamento até 5,2 meses (95%IC: 3,7-7,0) foi observado nos estudos avaliados, porém, existiu divergências nas indicações. As principais conclusões indicaram que há necessidade de adequado protocolo clínico para confecção das PTIs, envolvendo cirurgias minimamente invasivas e acompanhamento dos pacientes, a fim de se reduzir o desconforto e promover manutenção dos aspectos de dimensão vertical, oclusão bilateralmente balanceada e satisfação do paciente em relação ao tratamento. Palavras-Chave: Prótese total imediata. Revisão sistemática. Revestimento de prótese dentária.